

**DISSERTATIO DE  
HÆMORRHAGIIS  
A PRÆVALENTE  
SANGUINIS  
CHARACTERE...**

---

Sebastianus Pircher



# DISSERTATIO

DE

## HAEMORRHAGIIS

A PRAEVALENTE SANGUINIS CHARACTERE  
VENOSO ORTES

AD

DOCTORIS MEDICINAE LAUREAM

APUD AMBROSIVM

QUAM PUBLICE HABUIT

IN CELEBRATA AC PERPETUA

C. R. UNIVERSITATE PATAVINA

SÉBASTIANUS FIRCHER

TYROLENSIS NATSCHEVENS

MDCCCXXXVI. APUD MDCCLXXXVI

PATAVII

TYPIS SEMINARIJ

MDCCCXXXVI.



## PROOEMIUM

Cum leges academice medicum tyroem medicinæ scholis et testimoniis severis rite absolute de objecto quodam ex universæ medicinæ ramo aliquo desumpto disserere jubent, etiam ego mori antiquius recepto obedientiam nequaquam denegare possum.

De themate in dissertatione pertractando valde dubius fui, cum virum meum mediocritatem bene sciens, tam nequaquam ignorans, illæ medicinæ argumenta, de quibus sententiam facere in mente habui, a celeberrimis Auctoribus jam perbene descripta fuisset. Nihilominus cum in celeberrima Clinica Medica Patavi, dace clarissimo Consultario professore Brexa, ac perillustri professore Federigo, Clinicæ Medicinæ superioris Supplente, peculiarem observationem morbi historiam, quæ ad *Hæmorrhagias a prævalente sanguinis characterè venoso ortas* pertinet; ita hæc pro dissertationis objecto seligendas esse existimavi. Et eo magis cum animadvertierim medicos de earum origine adhuc valde discrepare, et in morbi historia a me observata occurrere omnes

4

hæmorrhagiarum formas ab Auctoribus descriptas, easque peruras, videlicet audorem sanguinem, profluvia cruenta ex oculis, auribus, mammarum papillis, et cæteris, quas in hoc opusculo profertur; non inutilem meum laborem qualemcumque fore confido.

Humanitas tamen vestra, ornatissimi Professores, Auditores, quoque etis, titulo spectatissimi! meum eriget animum, ubi perficillo hoc argumentum pertractare aggredier.

Præquam autem hujus hæmorrhagiarum speciei pertractationem exordiar, prævalentis venositatis definitionem, ejusdemque persequens causas atque effectus illi præmittam, ut hujusmodi profluviorum cruentorum theoria, ætiologia, symptomatologia, prognosis, therapia, et ipsa historia modo obiter et melius explanentur.

Patavi die 15 Augusti 1864

*Prævalentis venositatis definitio.*

*Venositas prævalens* à Germanis *erhörrachende Venosität* dicta, in eo consistit, quod sanguis venosus quantitate aut qualitate, aut circulations tali pacto vitietur, ut constitutio venosa toto in organismo locum habent.

Si tanta sanguinis venosi copia, aut sanguis carbonio et hydrogenio ita abundans ad pulmones feratur, aut ejusdem circulus tali modo peccet, ut ibi in sanguinem arterialem absolutam metamorphosis subire non possit; quid mirum, si non solum nimia in venis colligatur sanguinis copia, qui colorem atro-purpureum, veri abundantiam, cruentis petulant et misorem nium in conjunctionem et coagulatum firmum ostendit, sed et quod sanguis, qui in arterias transit, æque minus oxydatus qualitates sanguinis venosi præferat, atque inde venositas in systemate arterioso emittat? Eodem modo venositas adjecta systema vasorum capillarium occupare videatur adeo, ut indolem venosam et venarum functionem actionemque acquirat.

Sic igitur prævalens venositas per totum organismum diffunditur, ejus status constitutio venosa, seu vita venosa exalta dici potest.

*Causae praecipuae praevaletiae venositatis.*

Si alimentorum opportuno non digestio atque assimilatio prima bene viget, sanguinis autem venosi in arteriosum perfecta metamorphosis cohibetur ob vias genus densi, ob aerem minus bene constantem, praesertim oxygenii egeum, vel nimis aut contagio repletum, ob nervorum in vasa sanguifera efficaciam impellunt non perturbatum ex nimis affectionibus deprimentibus etc., nec ob constantiam deficientiam, nec ob quodcumque organorum respiratoria, secretionis, hepatis praecipua, cordis vel arteriarum vitium etc., necessario morbus, de quo loquimur, insequitur.

Haec causarum momenta, si praedispositio, saepe haereditaria, ad praevaletiam venositatem viget, occasionaliam more agunt. Ceterum majori praedispositione ad praevaletiam venositatem gaudent mulieres post aetate virili, temperamentum melancholicum, phlegmaticum, habitus laevi, atque variae aetatis periodi, praecipua aetate ad senectutem vergens etc.

*Effectus praevaletiae venositatis  
in oeconomia animali.*

Cum sanguis in intimo actu cum omnium organorum systematum organorumque actione et resolutione existat, cum ipse materiae organicae et vi-

riam vitalem fons sit; hic status dicitur sanguinis pathologicus non solum in systemate venoso, sed et in tota economia organismi animalis humani morbose agere, atque varias et multiplices a statu normali aberrationes, morbiq. formas promovere debet. Sic praevalens venositas congestionibus, inflammationibus, stasibus, infarctibus, viscerum tumoribus, dilatationi universali et topicae venarum, varicibus, venarum lacerationibus ac ulceribus foveat, atque senectuti communis, functionum cerebrellum, sensuum internorum et externorum, ac actionis muscularis alienationi, functionisque cordis, respirationis, digestionis, secretionis, nutritionis, et actionis systematis vasorum lymphaticorum perturbationi occasionem legitur. Praeterea fertilem nervosarum affectionum fontem, et maniae, melancholiae, hypochondriacae, hystericae etc., nec non genesis cachecticae variae, ex gr., hydropis, scorbuti, et febris putridae, flavae, typhi, icteri, arthritidis etc. amplectitur.

Praevalens venositas in systemate arterioso vel motus febriles excitare potest, qui cum consuetis febris phenomenonis ea etiam producat, quae a nimia venositate oriri solent. In systemate autem venoso character sanguinis venosi praedominans aufert aequilibrium inter vim motorem et resistentem, id est, inter vas et sanguinem; nam vis vasorum motu vi resistenti sanguinis non amplius



respondet. Quare conamina morbose vasorum certe timenda sunt, quae, uti quaelibet vis praeter modum incitata, in abnormem actionem transiunt; ex quo conditio pathologica oritur, quae congestionem dicitur, quae modo in peripheria, modo in raris majoribus aut in centro ipso contingere potest.

*Theoria haemorrhagiarum per secretionem a praevalente sanguinis characterem venoso provenientium.*

Cum conditio pathologica a praevalente venositate orta in utroque systemate sanguifero haec se se habeat, sanguinis refluxus per systema venosum collatus motui systematis arteriosi incitato respondere minime potest. Hinc necessario contingit, ut sanguis in partibus congestionem ex natura sua magis lentibus, aut morbo quocunque infirmatis aut perturbatis, et inde ad congestionem magis dispositis, accumuletur, ideoque coagulationes aut oriantur, aut quae adsunt, eo magis incrementum accedant. Cum vero secretio a sanguine ad organum secretoris affluens quantitate ac qualitate, ejusque circulo dependat, haec organum iniquè functio a norma aberrabit, sanguine quod qualitate aut copia, aut circulationem peccante. Quamobrem haemorrhae conditio normalis respondens in organo secretoris secreti minime pot-

sunt, si equilibrium a praevalente vasositate nata inter systema venosum et arterialem, nec non inter vasorum tunica et sanguinea locum habeat, atque inde organa secretoria singulari statu abnormali laeorent; imo si hic status pathologicus in gradu altiori vigeat, sanguis ipso loco humorum inquinorum in organis secretoriis secreti potest, atque ita haemorrhagiae per secretionem a praevalente vasositate facile nasci possunt.

Veteres in ea opinione fuerunt, haemorrhagias omnes nec a mechanicis, nec a chemicis laesionibus ortas (a recentioribus dynamicas dictas) ex anastomosi vel dispendio proficisci. Sed nec una nec altera sententia nobis promissa aridet. Existimamus potius opinionem recentiorum magis probabilem esse, quae huiusmodi haemorrhagiae originem actioni tribuit, quae secretioni similis est. Opinatur nempe haemorrhagias dynamicas in relatione cum secretionem existere, quia easdem plerumque ex organis secretoriis oriri observantur. Quamquam perspicue intelligi non possit, in quo organorum secretorium, et systematum sanguiferorum actio, et sanguinis ipsius conditio consistat, ut sanguis secretetur; certum tamen est, haemorrhagias dynamicas aut functione morbose organi, ex quo sanguis fluit, aut systematum sanguiferorum actione perturbata vel in quodam parte jure magis exaltata vel depresso, aut sanguinis circuli;

tionem mutata, aut cunctis hisce viis simul procedat.

Auctores multū hujus hæmorrhagiarum speciei originem a sanguine nimis liquido, quā in scorbuto, morbo musculoso hæmorrhagico Werlhofii, feбри putrida etc. observatur, pendere arbitrati sunt, opinantes, ejusmodi sanguinem catholis aut parietibus vasorum facilius emicare, minime immutantes, vasa sanguinis copias et quassas cedere, dilatari multo sanguine circulante, contrahi, ubi minor sanguinis copia continetur. Tali pacto vas sanguini valde liquido quoque resistere potest, quod majori jure contendere possumus; quia non raro observatur, sanguinem valde liquidum aequo-umque ex hirudinibus stillare, quin tamen spontaneæ hæmorrhagiæ conspiciantur. Præterea hæc explicatio nimis mechanica nobis videtur. Cum autem hujusmodi hæmorrhagiarum spem plerumque in organorum partibus, in quibus sanguinis viscositas prædominatur, et secretio eminet, ut in abdomine, et in morbis, ubi character sanguinis viscosus viget, ex gr., in scorbuto, morbo musculoso hæmorrhagico Werlhofii etc., oriri videamus; et cum præterea casus observentur, in quibus gravitate vite viscosi pronuntiata, atque inde sanguinis circulo mutata, et secretionē perturbata, etiam hæmorrhagiæ ex quocumque secretorio organo visæ sunt: quis hæmorrhagiarum, de quibus sermo est, originem ab egressu sanguinis nimis

fluidi mechanico per cuticula, parietesque vasorum potius, quam a prevalente sanguinis viscositate, et sublati inter systemata sanguifera aequilibrio, et perturbata aut vitata secretione, pendere nulla?

### *Aetiology.*

Ut haec haemorrhagiarum species melius digressi possit, ad causas praedisponentes atque occasionales configiendum est. Ad illas pertinere aetate virilis, ad senectutem vergens, aetna sequior, temperamentum melancholicum aut phlegmaticum, vita laevi, cibus sat bene nutritivus sustentatus, universalis solidarum partium leuitas, tristoribus animi affectionibus vel alijs causis depressivibus nata, habitus mollis, sensibilis nimis, ad spasmos dispositio, morborum debilitans, ut haemorrhagiarum etc., pericula superata, nimis Veneris abusus, abortus frequentiores aut parvus difficultates, quae momenta omnia organismum ad huiusmodi haemorrhagias disponent, ut frequenter prae-rumpentes, si causae occasionales agant, ut aer nimis calidus frigidusque, nimis vehementer diu-terque continuatus, nimis ventriculi atque intesti-norum repletio, evacuationum sanguinis contumace-rum vel naturalium, ut menstruum, suppressio, viscerum obstructio, violentior sanguinis agitatio per intensiores motus, curam nimiam, abstin-entiam, equitationem, animi affectus vehementiores,

magnam vocis dispendium, halitus juxta calidiora, alium calefacientium, aromaticorum, spirituosorum etc.

### *Symptomatologia.*

Antequam sanguis ex quadam organi parti erumpat, varia plethorae signa vel in universo corpore, vel in parte, cui modus inminet, plerumque seorsum manifestant. Contingunt scilicet a sanguinis copia nervos cerebrumque petnere, torpor quidam, motum animalium inertia, totius corporis lassitudo, somnolentia, ab impetu sanguinis adacto insoliti caloris sensus, titillatio ac dolor. Ceterum profluvium cruentum ex singulis partibus singulares etiam habet prodromos.

Narium haemorrhagiam praecedunt sensus in capite molestus, gratus, in regione frontali tensivus, acutus narium, ventrum temporum, oculorumque intumescencia cum aliq[uo] lucis intolerantia conjuncta, nonnunquam faciei tumor et rubor, aurium tinnitus, vertigo, palbus spasmodice contracti, horror, alvus aduriens, urina pauca, spurca, artuum frigida. Haemoptoea vero praecedunt motus interdum febriles, genarum rubor, dyspnoea, thoracis contractio, praecordiorum anxietas, cordis palpitatio, tussicula, dolor vel sub sternum, vel in pectore interiori ponderosus et punctorius, calor cum horrore alternans, sapor subdulcis, pul-

sus constrictus, durus, irritatus, frequens. Vomitus cruentum quoque futurum denotant praecordiorum anxietas, anorexia, ponderis in ventriculo sensus, cardialgia, alimtus adsumptis minimis adjectis, nausea, vomendi visus, epigastrii et hypochondriorum dolor constringens et praeterius, saepe etiam eorundem tumor, alvi perturbatio, horror cum calore alternans, inquietudo, sudores viscosi frigidique, pulsus exigui, contracti, crebri, tantumquam intermittentes, cordis palpitatio, aurium murmur, oculorum obscuritudo, vertigo, lipoptysia. Profluvium sanguinis locale et ante antecedent dolor pungens in oris sacri regione fixus, tensio intestini recti, tenesmus, dolores colici, sensus anxietatis, et pressoris ventriculi et hypochondriorum, capitis gravedo, anorexia, alvi constipatio, spasmi interdum et motus febriles. Haematuriam praesagunt dolor in regione lumbari et hypogastrica ardens, anxietas, convulsio spasmodica testium, abdomen tumidum, dolores colici, alvus constipata, calor et quandoque constrictione vesicae urinae, atque urethrae, dolor perineae, dysuria, stranguria etc. Metrorrhagiam extra graviditatem et partum indicant dolores in regione lumbari atque hypogastrica, sensus plenitudinis in imo ventre et versus genitalia, abdomen tumidum, tumor et dolor haemorrhoidum, horror cum calore alternans, alia, dolor capitis gravis, vertigo,

aurium tinnitus, vomendi visus, dolor spasmodicus in ventriculo, anxietas, respiratio impedita, cordis palpitatio, lassitudo ingens, pulsus frequent, irritatus, non raro intermittens, alvus adurita. Sanguinis fluxus ex oculis atque membranis palpillis, dolor in iisdem partibus pericoriosus, ardens; coarctatam eructum, aniam doctus; sudorem vero sanguineum, calor, ardor, pruritus et siccatas cutis, agnitio molesta, orgasmus, scabies, debilitas ingens, lipothymia etc. praesagire solent.

Quamquam haec symptomata omnibus haemorrhagiis sive a praevalencia venositate, sive ab exaltata sanguinis arteriositate oris communia sint; quaedam tamen momenta diagnostica ad eorum differentias statuenda nobis occurrunt. Sanguis nempe characteris arteriosi praepollentis e corpore ejectus floridior et magis coagulabilis est praesanguine venoso. Contra sanguis venositate exaltata praedictus, atro-purpureus, minus coagulabilis, cruoris egens et sero abundans est. Veruntamen haec signa sunt valde incerta, praecipue in internis haemorrhagiis. Quamquam enim sanguis characterem arteriosum praepollentem ab initio praesensent, tamen extra vas veritas coagulari, atque inde nigrescere et cum aliis humoribus mixtus effundi potest. Praeterea haemorrhagiarum prodromi characteris arteriosi saepissime gravesescent, qui characterem venosum habent, esse solent. Deni-

que aegri constitutio venosa et causae venositati praevalenti latentes atque symptomatus defectus, arteriositatem evaluatur indicantium, et phaenomenorum praesentia, venositatem praevalemtem commutatum, de haemorrhagiarum charactero nullum dubium reliquunt.

Haemorrhagiam praesentem externam ipse sanguinis effusus aut loco, aut copia insolitus ostendit: internam phaenomena varia pro loci diversitate, in quo accidit, manifestant. Sic sanguinis secreti collectionem in cavo uteri et abdominis sensus tensionis et caloris atque dolor obtusus in his partibus, faciei pallor, extremitatum frigus, magna debilitas, anxietas, lipthymia, vertigo, oculorum obscuratio, aurium sordidus, spasmus, convulsiones, pulsus parvi, debiles, intermittentes monstrant. Sanguinis vero ex vasis effusi accumulationem in thorace signa suffocationis, sicut in latere perdifficilis, anxietas summa, notumque tumor in regione lumbi, pulsus contracti, irritati, inaequales indicant. Ejus effusionem in ventriculo cerebri, aut ejusdem superficie symptomata apoplexiae propria testantur.

### *Prognosis.*

In prognosi proferenda ad locum affectum, ad causam, ad effectum, ad sanguinis effluentis copiam ac qualitatem, et symptomata, haemorrhagiam co-



mentis respiciendum erit. Si effectus de character sanguinis venoso predominante probus in morbum revocatus, a quolibet haemorrhagia, a praevalente venositate erit morbus hic venosus asserendus esse videatur. Nullum enim dari potest remedium, quod citius et tutius nimias sanguinis venosi copias medetur, quam ipsum sanguinis profusum, cujus efficaciam experientia confirmat; nam haemorrhoidum fluxus, tonibus cruentis, epistaxis, et catarrhis imprimis, insignem virtutem in variis affectionibus, hisque praecipue, quae sedem in venositate exorta habent, exercere solent. Ideo critica haemorrhagia appellatur, ex quarum suppressione nec pauci, nec levia saepe in hominibus, iisdem laborantibus oriuntur mala, ut cephalalgia, hemicrania, otalgia, odontalgia, ophthalmia, erysipelas, vertigo, sopor, apoplexia, angina, dase inflammationes, phrenitis, asthma, tabes, abdominis tormine, artuum dolor et rigor, convulsiones et epilepsia, febres gravissimae etc.

Attamen haemorrhagiae in aliis morbis, quoniam venositatem exortam agnoscent, nocivae et perniciosae evadunt; et haec symptomatice dicuntur, ut in febre putrida, periculis, scorbuto, morbo malarico haemorrhagiae Werthofii etc. Verum in huiusmodi affectionibus venositas quoad copiam sanguinis venosi non prevalere videtur, sed potius qualitas violatur.

Præterea si sanguis nimia velocitate gaudet, si per hæmaturia continuo sanguis indolis jure magis venosæ reproducatur, tactura abest, ut sanguis effuso sive naturali, sive artificiali saluti prospiciat, et potius egro damnum adferat; nam hæc hæmorrhagiae, quamvis sæpe ab initio levissimæ, imo salutes videantur, sensim tamen si diutius perduraverint, nimiam sanguinis copiam e corpore expellunt, et inde facile antiquæ sunt atque irreparabiles, quia immodica sanguinis profusio, ut plurimum gravissimum parit mala. Magna quidem in eo cernitur differentia, quod sanguis subito nec interrupta serie magnæque copia perumpat, aut sensim atque interjectis temporum intervallis profuit. Nihilominus notum est, tristes semper ac timendos effectus ex humoris hujus volubilitate, vitalis sanguis jure dicti, jactura nimis oriri, qui imprimis in systemate nervosi functione alienatione obsecratur. Sic debilitatem, diu sæpe post morbum superatum supervientem, sensum claudubitationem aut omnimodam privationem, synocpen, asphyxiam, surum cernitum, cephala, amaurosim, vertiginem, capitis gravedinem et dolorem, somnolentiam, delirium, spasmos, convulsiones, tetorem vialem imminutum, colorem cutis valde pallidum, faciem collapsam, pulsus exiguum, debiles et vitiosos, artuum frigas, sudores frigidos, nec non mortem ipsam inequal conspicimus.

Omnia uero haec phaenomena in haemorrhagia, a praevalente arteriositate ortis valde graviore et celeriore, et post minorem sanguinis perditū copiam, quam in illis a venositate praedominante satis apparent. E contra profluvia cruenta characteria venosi praevalentis saepius parvi sunt morbos, qui reproductionem perturbant veluti causam agnoscunt; huc spectant cachexiae variae, ut tubercula, haemica, hydrops, chlorosis etc.

Minus periculosae haemorrhagiae in locis communis ortae esse solent illae, quae ex locis inmolis et parvis alienis prorumpunt, licet ne haec quidem maxime semper periculo subiacent, dummodo leviores sint, ut sanguinis fluxus, quem menstruis suppressis interdum ex digitorum apicibus, mammarum papillis, oculorum angulis, aurium mentu et in tota cutis superficie prodians narrat. Sic legimus a doctore Aloysio Valentinis in suo opusculo, cui titulus est: *Voyage médical en Italie, fait en l'année 1820*, descriptam historiam foeminae 31 annorum, triam filiorum matris, quam in dissecando vicinis ab menstrui terrore repensino suppressa, haemophthysi et haemorrhagiis ex quocunque mentu naturali, papillisque mammarum prorupentibus laborantem invenit. Quamquam varia remedia derivatis, emmenagogis, evocanda in auxilium vocata fuerint, sanguis tamen e naribus, auribus, mamma, ven-

triculo, bronchiis, intestinis rectis, et urethra pertinaciter fluit. Derelictis positis remediis quibuscumque emmenagogis, atque interiori adhibitis refrigerantibus, exterius autem irritantibus in regione uervi et vaginæ, hanc formicæ scissæ, menstrualis iterum supervenientibus, resoluta est.

Hæmorrhagiæ albus magis notatæ sunt, si sanguis e vasis, sed minime ex organismo eliminatur. Effectus qui inde oriuntur, discrepant pro partium discrimine, in quibus sanguis secretus accumulat. Si effusio sanguinis fiat in ventriculis cerebri, apoplexia nasci solet, quæ ceteroquin in humilibus constitutione venosa prædictis frequenter occurrit. A sanguine effuso in superficie encephali oriuntur symptomata, quæ hujus organi pressio parere solet. Sanguinis collectio in cavo thoracis, pericardii, aut abdominis, pelvis et uteri phænomena producit, quorum numerosam præcæsumus. Si sanguis secretus colligitur in textu cellulari aut in organismi parte, in qua organa nobiliora minime læduntur, aut in suis functionibus cohibentur, doloris, pressionis sensus, majores vel minores maculæ caeruleæ, lividæ gignuntur. Sed pediatim hic sanguis iterum absorbetur, aut abscessus formatur, cum quorum parte deinde eliminatur. In cavitatibus vero sanguinis effusi absceptio tantummodo locum habet, si ejus copia exigua sit, nec a vasorum lacris-

tionis, sed a secretionis origine habet. Haemorrhagiae tandem mala pariunt in organis ipsis, in quibus contingunt. Secretiones scilicet statim post fluxum sanguinis dynamicum augentur; id quod iterum comprobatur, huiusmodi haemorrhagiae per secretionem rursus fieri.

Cum autem haec profluvia cruenta frequenter ex organis membrana mucosa vesicula oriuntur, atque sanguis in membranis muciparis plerumque coequeatur; haemorrhagiae inaequales haemorrhoeae plus minus disturnae, meliorhoeae, haemorrhoeae intestinalis, bronchialis, nasalis, urethrae etc., quae diversae organorum lesiones, ut inflammationes, concretiones, indurationes, ulcera, polypus, scirrhos, cancri efflicere possunt, aliisque pro loci diversitate phaenomena morbosa varia, et eo graviora, quo scilicet, magis gracile atque irritabile visus est, in quo sanguis secretus fuit. Si phaenomena ostenderint, vires in haemorrhagiis valde prosternti, salus plane incerta est. Ceterum quatenus more aliquo tempore post superata vehementiores sanguinis profusiones congruis remediis arceci possit, varia tamen in oeconomia animalis symptomata morbosa inturgunt, ut ad spasmus dispositio, forte nunquam removenda, ad novas haemorrhagias rursus, et alia mala plus minus fatalia, de quibus sermone facimus.

### *Therapia.*

Cura omnis radicalis tribus videtur indicationibus praecipuis, quarum prima est causas morbi removere; secunda causam, uti dicunt, morbi proximam, seu morbum ipsum extinguere; tertia tandem vitae et organisationi integritatem restituere.

Quare juxta primam indicationem causas hujusmodi haemorrhagiae cum praedispicientes, tum occasionales in aetiology enumeratas, quantum fieri potest, removendae sunt. Quibus amotis causa hujus haemorrhagiae speciei proxima, seu haemorrhagia ipsa deleatur oportet.

Cum autem in hac haemorrhagiarum specie aequilibrium inter systemata sanguifera a venositate praevalens sublatum, atque inde perturbata secretio causam proximam sistat, ut sanguis humorum inquiniorum loco in organis variis, praesertim secretoriis, secretetur; indicatio secunda in eo consistit, ut praevalens venositas quoad copiam sanguinis aut qualitatem peccet, atque inde sublatum inter systemata sanguifera aequilibrium, et perturbata secretio, videlicet secretio sanguinea, ad normalem conditionem redigatur. Quapropter semper medendi methodi, quae hinc indicationibus satisfarium, seligi debent. Hinc si aequilibrium perturbatum systematum sanguiferorum, atque secretionem cruentam a nimia sanguinis venosi copia

orientur; methodus evacuatoria, sive sanguinem subtrahens, sive purgans etc. juxta casus peculiare administratur. Si dictus status pathologicus non copiet nimiam sanguinis, venositatem praevalentem praediti, sed ejus qualitas mutata, ideoque in parte organismi quodam oritur aequo majori irritationi originem suam debeat; methodus sedativa sive sopiens, sive leniens adhibetur. Si vero aildatum systematum sanguiferorum aequilibrium, et eo effecta secretio cruenta, nec a quantitate sanguinis venosi nimia, nec ab ejusdem qualitate alienata, sed a viscerum sanguiferorum in parte quodam praedominante laesae atque ab organi alicujus secretoris juxta majori debilitate, per venositatem exaltatam praecedentem, haemorrhagia praegressa etc. inducta orientur; methodus roborans, stimulum locum habet.

Denique tenia indiculo hujusmodi haemorrhagiarum reliquias, in pinguetiam jam recessitas, partim nominatis medendi methodis, partim quoque aliis remediis sive chirurgicis, sive diægeticis juxta rem auferri, et ita organismo animali humano pristinam sanitatem, quoad fieri potest, restitui jubet.

*Morbis historia, addita confirmans.*

Beatrice Beranina, parvula, 35 annorum, femina, viro nupta, septem filiorum mater, temperamentum phlegmatico-cholerici, habitus scrophulo-

si, viginti quatuor annos nata typho, et anno vicesimo septimo aetatis haematemesi atque sanguine fluxu ex oculis, auribus, mammarum papillis, imo e tota corporis superficie ob eadem causa terrore repentino suppressa laboravit, a quibus morbi formis, menstruis rite redeuntibus, iterum liberabatur. Ante duos menses haec mulier, cum sex post partum dictus nutritio officio incumbere, atque seria vicissitudinibus exponeretur, et spirituosum potui siccis indulgeret, repente haec secretionem amittit. Quo factum est, ut crura valde tumuerint, atque dolores, tam per eadem, quam per reliquam corporis superficiem vagantes, febrique in conspectum sese dederint. Causa autem tantum abesset ut hic status pathologicus vi sola austeræ medicinae tolleretur, ut potius phaenomena morbi, videlicet phlegmata alba dolens extremitatum inferiorem, dolores vagi, praesentim in artubus superioribus, febris, anorexia, saepe amara, dysuria suggereretur, die 14 Martii anno 1826 ad celeberrimum Medicum Clanicum Patavii se se consultit.

1 die curatiois decoctio gum. cam. nigr. pro usu interno, et venae sectio in brachio ad unc. X. praescribitur; sed sepe tunc sanguinem copiosum colorem atro-purpurei cum tum et dolore pectoris, et tensionis sensum in epigastrio et hypochondrio sinistro rejicit. Quare altera eae die interne mixtura ex emulsionis gum. arab., coact.



rosar., syrup. sulphatis morphine unc. l., cujus  
 quolibet uncia grana l. sulphatis aut acetatis  
 morphinae continet; venae sectio ad unc. X.: 3  
 die epistaxis copiosa; remedium idem interueni:  
 4 die hæmoptoe; emulio gum. arab. cum citr.  
 et venae sectio ad unc. X.: 5 die hæmoptysis  
 rediit; nixæ suspensæ, emulio cum aq. cochat.  
 lauro-cera. gutt. XXX.: 6 die epistaxis, et 7 die  
 hæmoptoe comipitur. Febriæ peruerenti; quare me-  
 dicamentum idem interne rependitur, atque externe  
 hircudines n.° VII. ad epigastrium valde dolens:  
 11 die dolores ad ventrem et hypogastrium regionem  
 vehementes egrotantem aggrediuntur, quos hæma-  
 turia copiosa insequitur; remedium idem: 15 die  
 hæmoptoe; hinc cum dolores in regione lumbari  
 et hypogastrica adhuc magis augerentur, interius  
 emulio gum. arab., aq. cochat. lauro-cera., citr.  
 et syrup. sulphat. morphin., atque applicatio hircu-  
 dinum VII., et postea foveolæ emollientia loco  
 dolenti: 14 die quia dolores in epigastrio fortiores  
 redierunt, et hæmaturia febrique vehementior per-  
 severauit; venae sectio ad unc. IX. cum eisdem  
 remediis interuis: 16 die totius sanguinis atre-  
 purpuri cum dolore valente in epigastrio; quare  
 interius idem remedium, atque exterius hircudines  
 VII. in regione epigastrii dolente: 17 die ad hæ-  
 jumodi dolores subsecutos holi sex e morphinae  
 paries. gr. l. cum medulla panis et uel. desuperant.

prescribuntur: 19 die haematuria, et 20 haemip-  
 ptoe redeunt; hinc iterum emulsio gum. arab., sq.  
 coobat. laro-ceras. et syrop. sulphat. morphin. pro  
 usu interno; sed cum 21 die salinis crucians et  
 febris percreverant, celeberrimus Consultarius et  
 Professor Breus ad sequens remedium configit:  
 Rq. Puls. cor. perur. elect. unc. semis, chull. in  
 sq. font. unc. XVIII, et sub actu ebullit. add. elixir.  
 acid. Hall. dr. I., coq. denso ad resid. unc. XII;  
 colat. fortiter expretur add. mastig. gum. arab.  
 dr. II. d. v. e. a., ut sonatur pulsion. de die:  
 25 die idem remedium, et exterius unguent. ex  
 unct. emet. de. semis et anung. mill. dr. I. per-  
 tum duabus vicibus in epigastrio atque hypoga-  
 strio dolente applicand., et postea lotus emollien-  
 tes, qui cum eodem remedio interno usque ad 28  
 diem locum habuerunt. Nunc praetermittendo fo-  
 menta emollientia interius offerthatur succus an-  
 nast. cum sacch., cujus usus usque ad 44 diem  
 protrahitur: 54 die praeter haematuriam, angui-  
 nis fluxus ex ano cum dolore in regione umbilici  
 et laceris thoracis sinistri, et lipothymia. Hinc  
 cum sacco aurant. dalc., hirudines n. XII. num-  
 rose siccatae applicantur, fomento emolliente re-  
 quaque praetermittio: 59 die sanguis ex oculis  
 et ventriculo prorumpit; quapropter hirudines XII.  
 epigastrio dolendi admoventur, atque 41 die ex  
 utraque mamma et oculis cum dolore vehementi.

te, renes et hypogastrium occupante ac pubem  
exigua, irritata. Hinc ad hunc dolorem compe-  
scendum liniment. ex morphia. parias gr. III. et  
ol. amygdal. dulc. unc. I. et semis paratum pro  
frictione ad regiones dolentes praescriptum fuit.  
Cum a 44 die fluxus sanguinis copiosus modo ex  
omnibus his paribus, modo ex alia, modo ex al-  
tera cum dolore vehementi, ardore, dyspnoea,  
pulsibus parvis, irritatis, frequentibus usque ad 53  
diem pertinaciter persisteret, quatuor dies interius  
decocum ex rad. rathariae cum succo aurant.,  
exterius idem liniment. ex morphia. et ol. amygd.  
dulc.; deinde duobus diebus pro usu interno in-  
fusum fol. salviae cum spir. vitr. dulc., exterius  
una die applicatio hircorum XVI. vultu haemor-  
rhoïdalis, et altera renes secundo ad unc. X. in  
brochio. Postea tribus diebus principi anari cli-  
tas hircoris in sq. font. lib. II. solut. ser. I.,  
interius de die sumend.; exterius consuetum lini-  
ment. deprimens: 53 die agra summa virium in-  
firmata, lipothymia, anxietas, dyspnoea, orgasmo,  
calore intenso, ardore, pruritu et siccitate cutis  
corrupta fuit, quibus phaenomenis sudor sanguinis  
universalis superveit, qui quotidie apparuit usque  
ad 54 diem, haematuria et alvi fluxus sanguineo  
perdurantibus. Nunc catamenia copiosa, aut potius  
metrorrhagia, una die tantummodo perdurans cum  
negra doloris in locis affectis remissione, alia-

namque hæmorrhagiarum cessatione observabatur: 60 die amenorrhœa redeunte sudor singularis profusus, iisdem phaenomenis recensitis stipatus iterum ingruit, qui modo solus, modo cum aliis hæmorrhagiis, præsertim fluxu sanguinis ex ano, hæmaturia et hæmatemesi, reliquis confuso magis ciuitatibus conjunctus persistebat adeo, ut intra 16 dierum spatium sudor crucentus universalis decies, et ter partialis cum egrotantis magna virium dejectione in conspectum venerit: a 55 die interne modo decoctio ex chinæ bicoloris dr. II. aut simplex, aut cum liq. anodyn. mineral. Hoffmann., modo chinæ bicoloris principium amarum cum aq. rosæ citri et aq. menth. piperit., modo liq. anodyn. mineral., aq. menth. piperit. et syrup. simpl., aut holi XII. ex principii amari chinæ bicoloris dr. semis, extract. myrrh. aquosa. ana. II., et pulv. æthiops marialis scr. I. parat., adjuvando hulus II. om. bibl., aut limonæ tenuis cum sacch. administratur usque ad 74 diem, ubi ceteris remediis desectis, aqua hepatica cum lacte vaccino offerretur, atque ceteris ob dyspepsiam omittantur uso. XI. et dimidia sanguis, qui post 12 horas analysi chemicæ subjectus, inveniebatur immediate compositus ex cruceis uso. II., dr. VI.; seri alii uso. VIII., dr. VI. Serum continuè approximativè solam albuminis copiam. Crux præbuit decompositionis ope: fibrinæ hy-

dracm. unc. o., dr. o., gr. XLIV.; mucosae colorandae et sari sanguinis unc. II., dr. V., gr. XVI. summation unc. II., dr. VI.: 76 die sudor sanguinis universalis iterum copiosus. Hinc venae sectio ad unc. IX. repetita; interius idem remedium: 78 die hujusmodi boli administrantur: Rp. Pulv. hydrocyanat. potassae ferrugineae gr. XII., pulv. acid. uric. gr. XXIV. misc. cunctis, et c. s. q. rosb. samb. l. boli IV. cm. lib. I. admodum: 81 die ad sudorem sanguinis semper reduntem atque dolores, inferiores thoracis regionem occupantes, compensandos, venae sectio ad unc. VII. instituitur; interius idem remedium: 84 die phaenomenis morborum, de quibus sermo fuit, supervenit huiusmodi acridum excretio per alvum. Admittit aq. communis dest. unc. VIII., aq. cochlearum-cera. gutt. XX.: 86 die catamenia observantur, quibus superveniuntibus haemorrhagiae omnes cessant. Interius eadem remedia, externe foveae emollientes ad abdomen. Dolores in hypogastrio et lumbis fixi permittunt, atque icheria vesicae, 13 diebus spatio perdurans: 91 die sudor naturalis aquosus, haematuria cum dolore vehementi, vesicae regionem tenens, summa angustia ex aro. Hinc interius aequae nephriticae alcalinae Falcoseri lib. I. de die sumend., quae, eadem phaenomenorum forma persistens, repetitur usque ad 99 diem, ubi hoc remedio relicto, analgesia gutt. arab.

et el. amygd. dulc., et applicatio hirudinum XII., septem dierum circulo repetita ad remanentem dolentem fuit prescripta: 106 die sudor eructus in fronte et facie rediit, quavis in reliqua corporis superficie perspiratio a quindecim ab hinc diebus regularis esset: 115 die haematemesis, quae fere a duobus mensibus siluit, cum commota phaenomenis locum habuit, sed mox iterum evanuit: a 104 die usque ad 155 cum idem status pathologicus perseverasset, pro usu interno modo emulsio ex gum. arab. et el. amygd. dulc., modo aqua nephatica abstinens, aut aq. corn. dent. cum aq. coctat. lauro-corn., aut limones tenuis cum sacch., aut decoct. rad. alba lib. II. cum embonac. sedae dr. I., cernos. tartar. solub. dr. II., syrup. simpl. unc. I., paulatim de die admodum; externe fomenta frigida in hypogastrio dolenti cum aliquo segretantis levanis ordinata fuerunt.

Cum 135 die curatiois, 25 Julii hujus anni pro supplementis fungendo munere in hoc Clinicum Medicum Institutum ingressus fuerit perillustri Caspar Federigo Professor P. O. Clinicae Medicae pro Chirurgia provincialibus atque civilibus institutis; emulsorem gum. arab., amygd. dulc., semio. papaveris albi, atque extract. opii Beurni gr. I. et semis adsumendum cochlearum oct. lib. administravit, suspendendo alia remedia: 137 die materia tenax sanguinea per os et anum rejecta fuit.

Idem remedium internum: 158 die vomitus eructus silui; prescripserit doctorum maris pomat. unc. I. cum sq. ceras. nigr. unc. II., et chinæ tinct. Martov. unc. I. et singis cochlear. I. con. bib. succed. 159 die melius agra se se habet. Eodem remedia repetuntur usque ad 149 diem, ubi salubritas extracto opii p. d. Bonamè in erubescens eadem ex gum. arab., amygd. dulc. etc. dosis guttur. XX. laud. liquid. Altera die hæmorrhagia nulla; sed a 18 diebus ischuria renalis. Prescribitur aqua Rocochar. lib. I. de die paulatim sumend., cujus usus, quia optime ab agra toleratur, protrahitur usque ad 144 diem curatiois, ubi ischuria cessavit, agra magis naturalem faciei colorem et meliorem adspexitum præseferat; pulsus magis satii sperni et regulares; febris paucis ab hinc diebus evanescere coepit; vires incrementum incipiunt adire, ut lectum ægrotans per temporis intervalla distinguere possit. Prognosis tamen adhuc caute statuenda erat, nullus artis medicæ peritus delatibz.

Vota temporis angustia ulterius phænomena atque curacionem observare ac conscribere, cum nunc hæc apæcudum eruditorum disquisitioni subijciendum sit pro Laurea medica legimus accipienda.

## THESES

## I.

Prævalens sanguinis character venosus meretur majorem Medicorum attentionem.

## II.

Sudor sanguinis ab aliis hæmorrhagiis per secretionem facie non differt, excepto loco et completa phænometorum proprio.

## III.

Nihil fluxus menstruæ causam, male semper in plethora radicatum potest.

## IV.

Opinio: Crisis in arthritide, cujuscunque ludo-  
lis sit, sanguinis subunctione intercepti; falsa.

## V.

Ud præcepta: Omnem affectionem syphiliticam mercurii auxilio secari; damnum.

## VI.

Contagium a miasmate differt.

## VII.

Cataractas vitæa medela, ferrum.

## VIII.

Secio caecæ non nisi in discrimine matris ma-  
ximo instauranda.

## IX.

Calculus organorum utropiæcorum resolvi re-  
mediis internis nequit.



188

189

190

191

192

193

